M. Vallée, M.e en chir. en chef de l'hotel dieu à Meaux

No. 43 Observation au sujet d'un abcès penchant dans la capacité du bas-ventre.

Le nommé Pierre Roussel agé de 60 ans d'un temperament sec menusier à Meaux, ressentoit depuis plusieurs années des douleurs vagatives dans la région hypocondriaque droite qui ne l'empêchoit de faire ses affaires, de bien manger et de bien digerer lorsque le 9 avril 1774. après avoir été fatigué et été tombé plusieurs fois sur sa partie malade en revenant de quelques lieues de Meaux, la fievre le prit et continua les jours suivans avec des sueurs; il traita d'abord cavalierement ce commencement de maladie et ne m'appella qu'au bout de dix jours, c'étoit le 20. avril, je lui trouvai de la fievre et des sueurs continuelles, une douleur beaucoup plus forte dans la même region hypocondriaque, je n'y apperçu pas de tumeur mais il y avoit beaucoup de sensibilité: vu l'abondance des sueurs je me contentai de lui ordonner des boissons delaiantes et des lavemens pendant deux jours.

Le 3.e jour les accidens persistans je le saignai du bras, le sang étoit inflammatoire, le malade se trouva un peu soulagé; je reiterai la saignée le lendemain, le surlendemain je lui ~~reiterai la~~ saignée deux fois, le sang étoit

ARC 57 n° 103

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

toujours inflammatoire.

je mit le Malade a l'usage des boissons antiphlogistiques
j'appliquai sur l'endroit Malade un cataplasme emolient
alors il se manifesta une tumeur qui s'etendoit vers la
region epigastrique gauche. ensuite tout le bas ventre
devint tendu et douloureux et les Matieres Stercorales
cesserent de passer. les accidens persisterent plusieurs
jours malgré les Cataplasmes emoliens et les lavemens
laxatifs. mais aussi tot les Matieres Stercorales reprenant
leur Cours le ventre se dilendit et laissa mieux voir la tumeur
de l'hypocondre droite qui augmentoit tous les jours ainsi
que la douleur, mais sans changement de couleur
a la peau :
j'appliquai des Cataplasmes Maturatifs pour avancer
la terminaison par la Suppuration, huit jours apres j'appliquai
sur la tumeur dont la peau ne changeoit toujours point
de couleur, quoi qu'il se manifesta de la fluctuasion un
emplatre d'onguent de la Mere qui acheva de rendre
la fluctuasion bien Sensible, j'ouvris la tumeur le 9
Mai suivant en présence de Mr Barré mon Confrere
et de son frere alors chirurgien a Metz.

je me servit dabord de la lancette puis du bistouri et de
la sonde crenellée pour faire une incision oblique depuis
quatre travers de doigts au dessous du cartillage xiphoïde
jusqua quatre autres travers de doigts au dessous de lombilic
et deux de la ligne blanche du côté gauche, l'incision
avoit cinq travers de doigts de longueur aussitot quelle
fut faite il en sortit environ un demy septier de pus de
couleur verdatre et dune odeur fétide et stercorale. je
sondai avec mon doigt et je me trouvai dans la capacité,
a la faveur de mon doigt j'ai coupé haut et bas portion
des muscles qui s'opposoient a la libre sortie du pus. je sentis
distinctement les intestins. quelques petites arterioles qui
se trouverent dans le trajet de mon incision donnerent un
peu de sang ce qui mobligea de garnir un peu la playe.
le lendemain a la levée de l'appareil il sortit des matieres
couleur de lie de vin, je pançai la playe avec un digestif
ordinaire duquel jenduisis une meche pour passer
dans l'interieur, le tout recouvert dun emplatre donguent
de la mere.

au bout de quelques jours les levres de la playe étant devenües
livides j'emploiai le storax et leau vie camphrée en
place de digestif. je diminuai la meche de grosseur et
de longueur a mesure que le volume de la playe

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

diminuoit ~~de longueur~~ le pus fut semblable a de la lie
de vin pendant les sept a huit premiers jours, a la fin
il venoit un peu de pus de meilleur qualité. l'onguent de
stirax produisit l'effet que j'en attendoit il ranima les
chairs rendit les bords de la playe vermeilles, et le pus
devint plus louable.
j'ai fait ensuite quelques legeres injections avec le vin miellé.
et dans lequel je trempois aussi la meche et les plumaceaux.
je mis le malade a l'usage d'une infusion de quinquina,
je le purgai plusieurs fois a la fin et je terminai la guerison
par une cicatrice solide au bout de 40 jours. le malade
ne ressent plus aucune douleur a l'hypocondre gauche.
j'ai fondu la dureté qui s'i trouvoit par l'application d'un
emplatre de cigüe.